

Resumen ejecutivo

El actual boletín informativo de CropWatch comprende entre octubre de 2013 y enero de 2014, período que podríamos considerar mayormente "entre estaciones": ha finalizado la cosecha de cultivos invernales (trigo) en el hemisferio sur y los cultivos de verano crecen aún faltando varios meses para la cosecha. En el hemisferio norte los cultivos de invierno han sido plantados antes o al comienzo del período sobre el que informamos y actualmente se encuentran en etapa de letargo en latitudes septentrionales o creciendo activamente en zonas más meridionales. Los cultivos de verano en las regiones templadas se plantarán en un par de meses.

Aunque en algunas zonas el temor de un impacto negativo no se disipó hasta aproximarse la cosecha (por ejemplo, en Australia, debido a las condiciones de sequía y calor), tres de los cuatro principales productores de trigo en el hemisferio sur tuvieron buenos resultados, cosechando, en conjunto, 43 millones de toneladas. En varios países el área plantada de trigo y su rendimiento mejoraron el año 2012, como es el caso de Argentina (+14% de la producción), Australia (+17%) y Brasil (+31%). En Sudáfrica, la disminución de un 6% en la producción de esta temporada continúa la tendencia iniciada hace más de 10 años.

Los terrenos cultivados en China aumentaron cerca de un 10% en comparación con el promedio de los últimos cinco años, reduciéndose las posibles pérdidas ocasionadas gracias a la particular calidez de este invierno. El área cultivada disminuyó en Rusia (-11,8%) y también en Turquía. En esta última, la reducción alcanzó casi un 20% como resultado de los descensos de la temperatura y de las lluvias. La tierra cultivada también disminuyó en Canadá (-10,7%) y en Estados Unidos (-5,9%).

En el transcurso del período sobre el que informamos, el tifón Haiyan azotó Filipinas, afectando también a Vietnam y a China. Según el Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED) y la FAO, este ciclón fue una de las peores catástrofes de los últimos años en Filipinas y afectó fuertemente a la población y a la agricultura, con una pérdida total en la economía que se espera alcance los 10.000 millones de dólares. Las pérdidas en el sector agrícola ocurrieron mayormente en las islas Bisayas al centro de Filipinas, donde se cultiva alrededor del 35% de la producción nacional de arroz. Otros cultivos se vieron menos afectados gracias al calendario local de plantaciones. La pérdida conjunta debida a Haiyan y a Nari, este último un ciclón que afectó anteriormente al país en la misma temporada, se estima

actualmente en un 5% de la producción anual. A consecuencia de ello, se espera un incremento en las importaciones de arroz.

Es posible reconocer diversos patrones climáticos continentales. Entre ellos se incluyen: (i) bajas temperaturas inusuales en Estados Unidos y Canadá (ii) lluvias por sobre el promedio en el sur de Asia y en los países adyacentes a la zona semi árida del Asia central, disminuyendo desde Irán a Camboya; (iii) sequía al sur y al este del Mediterráneo y (iv) temperaturas por sobre el promedio en la mayor parte del norte de Eurasia, desde Siberia y China hasta Alemania, con sequía en algunas zonas de Europa central.

Moldavia registró uno de los mayores descensos en la pluviosidad absoluta (-68%) entre 173 países monitoreados por CropWatch. Algunos países vecinos también se vieron afectados, como es el caso de Ucrania (-25%). Marruecos, por su parte, experimentó una grave sequía combinada con poca luz solar, liderando las pérdidas en la producción de trigo y cebada que podrán alcanzar hasta un 30%, a menos que una lluvia abundante afectara al país de ahora en adelante. Se ha detectado una sequía precoz en Sudamérica que afecta al corazón de la zona productora de soja. El problema parece haber sido solucionado por ahora, aunque la condición mixta de cultivos continúa prevaleciendo en la zona noroeste de Argentina y en el litoral sur de Brasil.

Otras situaciones menos espectaculares han afectado la agricultura en un cierto número de países. Se deberá evaluar su impacto final al acercarse la cosecha, ya que las consecuencias negativas iniciales posiblemente podrán contrarrestarse con condiciones medioambientales favorables en etapas posteriores de cultivo.

En líneas generales, CropWatch resume de forma tentativa la temporada actual de la siguiente manera:

Mayormente desfavorable: Armenia, Azerbaiyán, Canadá, Georgia, Filipinas, Polonia, España, Turquía, Ucrania, Moldavia, Marruecos, Estados Unidos y Vietnam.

Mixta: Argentina, Brasil, China, Dinamarca, Egipto, Francia, Hungría, Indonesia, Irán, Italia, Nigeria, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido y Uzbekistán.

Mayormente favorable: Bangladesh, República Checa, Alemania, India, Kazajistán, México, Myanmar, Paquistán y Tailandia.